


El cas del mes


Desembre 2013



Pàpules al penis d'un nen de 7 anys

El cas del mes

Desembre 2013



A la imatge anterior, la silueta és absolutament característica. En aquesta, veiem l'infiltrat limfohistiocitari amb cèl·lules gegants multinucleades i el dany basal amb dipòsit de fibrina que ajuden a confirmar el diagnòstic

Diagnòstic: Líquen nítid

Comentari

- Aquestes lesions són molt típiques tan microscòpicament com clínica. Solen aparèixer a extremitats superiors, tronc o genitals de nens o adults joves. Són erupcions de minúscules pàpules brillants
- El principal problema del diagnòstic microscòpic és que al ser lesions tan diminutes de vegades cal fer talls addicionals per poder veure adequadament la seva morfologia. A més de vegades a ser pacients en edat pediàtrica les biòpsies són afaitats superficials que es trenquen o no és possible orientar al bloc histològic. Sempre s'ha de pensar que si es decideix fer una biòpsia, val la pena fer-la ben feta i que serveixi per alguna cosa
- Microscòpicament la epidermis aprimada al centre i amb dues “pinces de crac” flanquejant lateralment l'infiltrat és la característica més distintiva d'aquesta lesió. La presència d'histiòcits i cèl·lules multinucleades i el dany basal amb disqueratosi o fibrina són dades addicionals que confirmen el diagnòstic